

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

**0 261 539
A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87113393.0

(22) Anmeldetag: 14.09.87

(51) Int. Cl. 4: **C07D 215/26**, C07D 215/20 ,
C07D 215/22 , C07D 215/14 ,
C07D 213/74 , C07D 213/38 ,
A61K 31/47 , A61K 31/44

(30) Priorität: 24.09.86 DE 3632329
(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
30.03.88 Patentblatt 88/13
(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: **BAYER AG**
Konzernverwaltung RP Patentabteilung
D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)
(72) Erfinder: Mohrs, Klaus, Dr.
Claudiusweg 9
D-5600 Wuppertal 1(DE)
Erfinder: Perzborn, Elisabeth, Dr.
Am Tescher Busch 13
D-5600 Wuppertal 11(DE)
Erfinder: Seuter, Friedel, Dr.
Moospfad 16
D-5600 Wuppertal 1(DE)
Erfinder: Fruchtman, Romanis, Dipl.-Biologin
Konrad-Adenauer-Ufer 71
D-5000 Köln 1(DE)
Erfinder: Kohlsdorfer, Christian, Dr.
Franz-Stryck-Strasse 16
D-5042 Erftstadt(DE)

(54) **Substituierte Phenylsulfonamide.**

(57) Neue substituierte Phenylsulfonamide können durch Umsetzung von entsprechenden Aminen mit Sulfonhalogeniden hergestellt werden. Die neuen Verbindungen können als Wirkstoffe zur Hemmung von enzymatischen Reaktionen und zur Hemmung der Thrombozytenaggregationen eingesetzt werden.

EP 0 261 539 A2

BEST AVAILABLE COPY


Substituierte Phenylsulfonamide

Die Erfindung betrifft substituierte Phenylsulfonamide, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung in Arzneimitteln.

Aus US-Patentschrift 4 581 457 ist bekannt, das Phenylsulfonamide mit einer Benzimidazolymethoxygruppe oder mit einer Benzothiazolymethoxygruppe im Aromaten antiinflammatorische Wirkung haben.

5 O-Pyridyl-benzylsulfonamide werden in JP 61/010548 mit einer antiinflammatorischen und antithrombotischen Wirkung und in CA 101, 110849 v mit einer Pflanzenschutzwirkung beschrieben.

Die vorliegende Erfindung betrifft neue substituierte Phenylsulfonamide der allgemeinen Formel (I)



in welcher

R¹ -für einen Pyridyl-, Chinolyl-oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Halogen, Alkyl, Cycloalkyl, Alkoxy, Cyano, Nitro, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkoxycarbonyl oder Alkylsulfonyl,

20 R² -für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Halogen, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl, Halogenalkoxy oder Alkoxycarbonyl steht,

R³ -für einen Arylrest steht, der bis zu dreifach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch Halogen, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Cyano, Nitro oder Alkoxycarbonyl, oder

25 -für Pentafluorphenyl oder

- für geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl steht, das substituiert sein kann durch Halogen, Aryl, Aryloxy, Cyano, Alkoxycarbonyl, Alkoxy, Alkylthio oder Trifluormethyl und

X - für eine Gruppierung -O-, -A-B-oder -B-A-steht,

30 wobei

A - -O-,



, oder



bedeutet und

45 B - -CH₂-oder



bedeutet

wobei R¹ nicht für einen Pyridylrest stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O-steht, und deren Salze.

Die erfindungsgemäßen substituierten Phenylsulfonamide können auch in Form ihrer Salze vorliegen. Im allgemeinen seien hier Salze mit organischen oder anorganischen Säuren genannt.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden physiologisch unbedenkliche Salze bevorzugt. Physiologisch unbedenkliche Salze der substituierten Phenylsulfonamide können Salze der erfindungsgemäßen Stoffe mit Mineralsäuren, Carbonsäuren oder Sulfonsäuren sein. Besonders bevorzugt sind z.B. Salze mit Chlorwasserstoffsäure, Bromwasserstoffsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Methansulfonsäure, Ethansulfonsäure, Toluolsulfonsäure, Benzolsulfonsäure, Naphthalindisulfonsäure, Essigsäure, Propionsäure, Milchsäure, Weinsäure, Zitronensäure, Fumarsäure, Maleinsäure oder Benzoesäure.

Die erfindungsgemäßen Stoffe zeigen überraschenderweise eine gute antiinflammatorische und thrombozytenaggregationshemmende Wirkung und können zur therapeutischen Behandlung von Menschen und Tieren verwendet werden.

Alkyl steht im allgemeinen für einen verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt wird Niederalkyl mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt ist ein Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl, Isohexyl, Heptyl, Isoheptyl, Octyl und Isooctyl genannt.

Cycloalkyl steht im allgemeinen für einen cyclischen Kohlenwasserstoffrest mit 5 bis 8 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt sind der Cyclopentan- und der Cyclohexanring. Beispielsweise seien Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl und Cyclooctyl genannt.


Alkoxy steht im allgemeinen für einen über ein Sauerstoffatom gebundenen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist Niederalkoxy mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt ist ein Alkoxyrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, Pentoxy, Isopentoxy, Hexoxy, Isohexoxy, Heptoxy, Isoheptoxy, Octoxy oder Isooctoxy genannt.

Alkylthio steht im allgemeinen für einen über ein Schwefelatom gebundenen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist Niederalkylthio mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt ist ein Alkylthioest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien Methylthio, Ethylthio, Propylthio, Isopropylthio, Butylthio, Isobutylthio, Pentylthio, Isopentylthio, Hexylthio, Isohexylthio, Heptylthio, Isoheptylthio, Octylthio oder Isooctylthio genannt.

Alkylsulfonyl steht im allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, der über eine SO_2 -Gruppe gebunden ist. Bevorzugt ist Niedrigalkylsulfonyl mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien genannt: Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Propylsulfonyl, Isopropylsulfonyl, Butylsulfonyl, Isobutylsulfonyl, Pentylsulfonyl, Isopentylsulfonyl, Hexylsulfonyl, Isohexylsulfonyl.

Aryl steht im allgemeinen für einen aromatischen Rest mit 6 bis etwa 12 Kohlenstoffatomen. Bevorzugte Arylreste sind Phenyl, Naphthyl und Biphenyl.

Alkoxycarbonyl kann beispielsweise durch die Formel



dargestellt werden.

Alkyl steht hierbei für einen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt wird Niederalkoxycarbonyl mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen im Alkylteil. Insbesondere bevorzugt wird ein Alkoxycarbonyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylteil. Beispielsweise seien die folgenden Alkoxycarbonylreste genannt: Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, Butoxycarbonyl oder Isobutoxycarbonyl.

Aryloxy steht im allgemeinen für einen aromatischen Rest mit 6 bis etwa 12 Kohlenstoffatomen, der über ein Sauerstoffatom gebunden ist. Bevorzugte Aryloxyreste sind Phenoxy oder Naphthoxy.

Halogenalkyl steht im allgemeinen für geradkettiges oder verzweigtes Niederalkyl mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen und einem oder mehreren Halogenatomen, bevorzugt mit einem oder mehreren Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen. Bevorzugt ist Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und mit einem oder mehreren Fluor- und/oder Chloratomen. Besonders bevorzugt ist Alkyl mit 1 bis 2 Kohlenstoffatomen und mit bis zu 5 Fluoratomen oder mit bis zu 3 Chloratomen. Beispielsweise seien genannt: Fluormethyl, Chlormethyl, Brommethyl, Fluorethyl, Chlorethyl, Bromethyl, Fluorpropyl, Chlorpropyl, Brompropyl, Fluorbutyl, Chlorbutyl, Brombutyl, Fluorisopropyl, Chlorisopropyl, Bromisopropyl, Fluorisobutyl, Chlorisobutyl, Bromisobutyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Dichlormethyl, Trichlormethyl, Difluorethyl, Dichlorethyl, Trifluorethyl und Trichlorethyl. Ganz besonders bevorzugt sind Trifluormethyl, Difluormethyl, Fluormethyl und Chlormethyl.

Halogenalkoxy steht im allgemeinen für über ein Sauerstoffatom gebundenes geradkettiges oder verzweigtes Niederalkyl mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen und einem oder mehreren Halogenatomen, bevorzugt mit 1 oder mehreren Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen. Bevorzugt ist Halogenalkoxy mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und mit einem oder mehreren Fluor- und/oder Chloratomen. Besonders bevorzugt ist Halogenalkoxy mit 1 bis 2 Kohlenstoffatomen und mit bis zu 5 Fluoratomen oder mit bis zu 3 Chloratomen. Beispielsweise seien genannt: Fluormethoxy, Chlormethoxy, Fluorethoxy, Chlorethoxy, Bromethoxy, Fluorpropoxy, Chlorpropoxy, Brompropoxy, Fluorbutoxy, Chlorbutoxy, Brombutoxy, Fluorisopropoxy, Chlorisopropoxy, Bromisopropoxy, Difluormethoxy, Dichlormethoxy, Trifluormethoxy, Trichlormethoxy, Difluorethoxy, Dichlorethoxy, Trifluorethoxy, Trichlorethoxy. Ganz besonders bevorzugt sind Trifluormethoxy, Difluormethoxy, Fluormethoxy und Chlormethoxy.

Halogen steht im allgemeinen für Fluor, Chlor, Brom oder Iod, bevorzugt für Fluor, Chlor oder Brom. Besonders bevorzugt steht Halogen für Fluor oder Chlor.

Bevorzugt werden Verbindungen der allgemeinen Formel (I) in welcher

R¹ -für einen Pyridyl-, Chinolyl- oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Brom, Niederalkyl, Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Niederalkoxy, Cyano, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Niederalkoxycarbonyl, Niederalkylsulfonyl,

R² -für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Fluor, Chlor, Brom, Niederalkyl, Niederalkoxy, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, oder Niederalkoxycarbonyl steht,

R³ -für Phenyl steht, das bis zu 2-fach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Brom, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Niederalkyl, Niederalkoxy, Niederalkylthio, Niederalkylsulfonyl, Cyano, Niederalkoxycarbonyl oder

-für Pentafluorphenyl oder

-für geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen steht, das substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Brom, Phenyl, Phenoxy, Cyano, Niederalkoxy oder Trifluormethyl


und

X - für eine Gruppierung -O-, -A-B- oder -B-A- steht,


wobei

A - -O-,

30



35 oder




40

bedeutet

und

B - -CH₂- oder

45



50 bedeutet,

wobei R¹ nicht für einen Pyridylrest stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O- steht, und deren Salze.

Besonders bevorzugt sind solche Verbindungen der allgemeinen Formel (I) in welcher

R¹ -für einen Pyridyl-, Chinolyl- oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder durch Trifluormethyl,

R² -für Wasserstoff, Cyano, Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluormethyl, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl oder Propoxycarbonyl steht,

R³ -für Phenyl steht, das substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Alkyl mit

bis zu 4 Kohlenstoffatomen, Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, Cyano, Alkoxy-carbonyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, oder
 -für Pentafluorphenyl oder
 -für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen steht, das substituiert sein kann
 5 durch Fluor, Chlor oder Phenyl
 und
 X - für -O-, -OCH₂-, -CH₂O-, -OCH(CH₃)-, -CH₂N(CH₃)-, -CH₂N(CH₃)CH₂CH₂- steht,
 wobei R¹ nicht für einen Pyridylrest stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O- steht,
 und deren Salze.


10 Beispielsweise seien folgende substituierte Phenylsulfonamide genannt.

- N-[2-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[2-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
- N-[2-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-butansulfonamid
- N-[2-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid
- 15 N-[2-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]butansulfonamid
- N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid
- 20 N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid
- N-[3-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[3-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
- N-[3-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid
- N-[3-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid
- 25 N-[3-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]butansulfonamid
- N-[4-(Chinolin-7-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-7-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-7-yloxy)phenyl]butansulfonamid
- N-[4-(Chinolin-7-yloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid
- 30 N-[4-(Chinolin-7-yloxy)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid
- N-[4-(4-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[4-(4-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
- N-[4-(4-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]butansulfonamid
- N-[4-(Chinolin-8-yloxy)-3-chlorphenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- 35 N-[4-(Chinolin-8-yloxy)-3-chlorphenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
- N-[4-(6-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]butansulfonamid
- N-[4-(6-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[2-(4-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[2-(4-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]butansulfonamid
- 40 N-[4-(Chinolin-6-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-6-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-6-yloxy)phenyl]butansulfonamid
- N-[2-(Chinolin-6-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[2-(Chinolin-6-yloxy)phenyl]butansulfonamid
- 45 N-[4-(4-Methylchinolin-2-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]butansulfonamid
- N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid
- 50 N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]pentafluorbenzolsulfonamid
- N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-1-methylbutansulfonamid
- N-[2-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[2-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
- N-[2-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]butansulfonamid
- 55 N-[2-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid
- N-[3-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
- N-[3-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid Hydrochlorid
- N-[3-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]butansulfonamid

- N-[3-(Chinolin-2-yl-methyloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid
 N-{4-[1-(Chinolin-2-yl)ethyloxy]phenyl}butansulfonamid
 N-[4-(Chinolin-2-yl)methyloxy-3-cyano-phenyl]butansulfonamid
 N-[3-Ethoxycarbonyl-4-(chinolin-2-yl)methyloxy-phenyl]butansulfonamid
 5 N-[2-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
 N-[3-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
 N-[3-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
 N-[3-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]butansulfonamid
 N-[3-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid
 10 N-[2-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]butansulfonamid
 N-[2-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
 N-[2-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid
 N-[3-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid
 N-[2-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid
 15 N,N',N'-[3-(Methyl-2-pyridyl-aminomethyl)phenyl]butansulfonamid
 N,N',N'-[3-(Methyl-2-pyridyl-aminomethyl)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid
 N,N',N'-[3-(Methyl-2-pyridyl-aminomethyl)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
 N,N',N'-[3-(Methyl-2-pyridyl-aminomethyl)phenyl]-4-chlor-benzolsulfonamid
 N,N',N'-[3-{[Methyl-2-(2-pyridyl)ethyl]aminomethyl}phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid
 20 N,N',N'-[3-{[Methyl-2-(2-pyridyl)ethyl]aminoethyl}phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid
 N,N',N'-[3-{[Methyl-2-(2-pyridyl)ethyl]aminoethyl}phenyl]butansulfonamid

Weiterhin wurde ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen substituierten Phenylsulfonamide der allgemeinen Formel (I)

25




30

in welcher


- R¹ -für einen Pyridyl-, Chinolyl-oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Halogen, Alkyl,
 35 Cycloalkyl, Alkoxy, Cyano, Nitro, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkoxycarbonyl oder Alkylsulfonyl,
 R² -für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Halogen, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl, Halogenalkoxy oder Alkoxycarbonyl
 steht,
 R³ -für einen Arylrest steht, der bis zu dreifach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch
 Halogen, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Cyano, Nitro oder Alkoxycar-
 40 bonyl oder
 -für Pentafluorphenyl oder
 -für geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl steht, das substituiert sein kann durch Halogen, Aryl,
 Aryloxy, Cyano, Alkoxycarbonyl, Alkoxy, Alkylthio oder Trifluormethyl
 und
 45 X - für eine Gruppierung -O-, -A-B-oder -B-A-steht,
 wobei
 A - -O-,

50




, oder


55




bedeutet
E - -CH₂- oder



bedeutet
wobei R¹ nicht für einen Pyridylrest stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O- steht,
und deren Salze
gefunden, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man Amine der allgemeinen Formel (II)



in welcher
R¹, R² und X die oben angegebene Bedeutung haben, mit Sulfonsäurehalogeniden der allgemeinen Formel
(III)




in welcher
R³ die oben angegebene Bedeutung hat
und

Y - für Halogen steht

in Gegenwart eines inerten Lösemittels, gegebenenfalls in Gegenwart einer Base umgesetzt und dann
gegebenenfalls im Fall der Herstellung der Salze mit einer entsprechenden Säure umgesetzt.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann durch folgendes Formelschema erläutert werden:



Als Lösemittel für das erfindungsgemäße Verfahren eignen sich übliche organische Lösemittel, die sich
unter den Reaktionsbedingungen nicht verändern. Hierzu gehören bevorzugt Ether wie Diethylether, Dioxan,
Tetrahydrofuran oder Glykoldimethylether, oder Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol, Xylol, Hexan,
Cyclohexan oder Erdölfractionen, oder Halogenkohlenwasserstoffe wie Dichlormethan, Trichlormethan, Te-
trachlormethan, Dichlorethylen, Trichlorethylen oder Chlorbenzol, oder Essigester, Triethylamin, Pyridin,
Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, Hexamethylphosphorsäuretriamid, Acetonitril, Aceton oder Nitrome-

than. Ebenso ist es möglich, Gemische der genannten Lösemittel zu verwenden.

Basen für das erfindungsgemäße Verfahren können übliche basische Verbindungen sein. Hierzu gehören vorzugsweise Alkali- oder Erdalkalihydroxide wie Lithiumhydroxid, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid oder Bariumhydroxid, oder Alkalihydride wie Natriumhydrid, oder Alkali- oder Erdalkalicarbonate wie Natriumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat oder Calciumcarbonat, oder Alkalialkoholate wie beispielsweise Natriummethanolat, Natriumethanolat, Kaliummethanolat, Kaliumethanolat oder Kalium-tert-butylat, oder Alkaliamide wie Natriumamid oder Lithiumdiisopropylamid, oder organische Amine wie Benzyltrimethylammoniumhydroxid, Tetrabutylammoniumhydroxid, Pyridin, Dimethylaminopyridin, Triethylamin, N-Methylpiperidin, 1,5-Diazabicyclo[4,3,0]non-5-en oder 1,5-Diazabicyclo[5,4,0]undec-5-en.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird im allgemeinen in einem Temperaturbereich von -30°C bis $+150^{\circ}\text{C}$, bevorzugt von -20°C bis $+80^{\circ}\text{C}$ durchgeführt.


Das erfindungsgemäße Verfahren wird im allgemeinen bei Normaldruck durchgeführt. Es ist aber auch möglich, das Verfahren bei Überdruck oder bei Unterdruck durchzuführen (z.B. in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar).

Im allgemeinen setzt man 1 bis 5 Mol, bevorzugt 1 bis 2 Mol, besonders bevorzugt 1 Mol Sulfonsäurehalogenid, bezogen auf 1 Mol des Amins ein. Die Base wird im allgemeinen in einer Menge von 1 bis 10 Mol, bevorzugt von 1 bis 5 Mol, bezogen auf das Sulfonsäurehalogenid eingesetzt.

Als Sulfonsäurehalogenide für das erfindungsgemäße Verfahren seien beispielsweise genannt:

- 4-Toluol-sulfonylchlorid
- 4-Chlorphenyl-sulfonylchlorid
- 4-Fluorphenyl-sulfonylchlorid
- 3-Trifluormethylphenyl-sulfonylchlorid
- Pentafluorphenyl-sulfonylchlorid
- 2,5-Dichlorphenyl-sulfonylchlorid
- 4-Methoxyphenyl-sulfonylchlorid
- Propyl-sulfonylchlorid
- Butyl-sulfonylchlorid
- Isobutyl-sulfonylchlorid
- 1-Methylbutyl-sulfonylchlorid
- 3-Chlorpropyl-sulfonylchlorid
- 4-Chlorbutyl-sulfonylchlorid
- Pentyl-sulfonylchlorid

Die als Ausgangsstoffe eingesetzten Amine der allgemeinen Formel (II)



in welcher

R^1 - für einen Pyridyl-, Chinolyl- oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Halogen, Alkyl, Cycloalkyl, Alkoxy, Cyano, Nitro, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkoxy-carbonyl oder Alkylsulfonyl,

R^2 - für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Halogen, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl, Halogenalkoxy oder Alkoxy-carbonyl steht,

und

X - für eine Gruppierung

-O-, -A-B- oder -B-A- steht,


wobei

A - -O-,




, oder

5



bedeutet
und B - $-\text{CH}_2-$ oder


10



15 bedeutet

wobei R^1 nicht für eine Pyridylgruppe stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O- steht, können hergestellt werden, indem man Nitroverbindungen der allgemeinen Formel (IV)

20



25


in welcher

30 R^1 , R^2 und X die oben angegebene Bedeutung haben reduziert.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann durch folgendes Formelschema erläutert werden:

35

40



45 Die Reduktion erfolgt im allgemeinen durch Hydrierung mit Metalkatalysatoren wie beispielsweise Platin, Palladium, Palladium auf Tierkohle, Platinoxid oder Raney-Nickel, bevorzugt mit Palladium auf Tierkohle, in Anwesenheit von Säuren.

Als Säuren können erfindungsgemäß starke Mineralsäuren aber auch organische Säuren eingesetzt werden. Bevorzugt sind dies Salzsäure, Bromwasserstoffsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, oder Carbonsäuren wie Essigsäure, Oxalsäure, Trifluoressigsäure, oder Sulfonsäuren wie Methan-, Ethan-, Phenyl- oder Toluolsulfonsäure, oder Naphthalindisulfonsäure.

Der Katalysator wird hierbei im allgemeinen in einer Menge von 0,1 bis 50 Mol-%, bevorzugt von 1 bis 10 Mol-% bezogen auf 1 Mol der Nitroverbindung eingesetzt.

Die Hydrierung erfolgt im allgemeinen in einem Temperaturbereich von -20°C bis $+100^\circ\text{C}$, bevorzugt im Bereich von 0°C bis $+50^\circ\text{C}$.

Im allgemeinen erfolgt die Hydrierung bei Normaldruck. Es ist ebenso möglich, die Hydrierung bei einem Überdruck von 2 bis 200 bar, bevorzugt von 2 bis 50 bar durchzuführen.

Als Lösemittel für die Hydrierung eignen sich Wasser und inerte organische Lösemittel. Bevorzugt gehören hierzu Alkohole wie beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol, oder Ether wie Diethylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, Glykolmono- oder -dimethylether, oder Chlorkohlenwasserstoffe wie Methylenchlorid, Chloroform oder Tetrachlorkohlenstoff, oder Eisessig, Trifluoressigsäure, Dimethylformamid, Hexamethylphosphorsäuretriamid, Essigester, Aceton oder Pyridin. Ebenso ist es möglich, Gemische der genannten Lösemittel einzusetzen.

Darüberhinaus kann die Reduktion auch nach Methoden durchgeführt werden, wie sie im allgemeinen zur Reduktion von Nitrogruppen zu Aminogruppen üblich ist. Hierbei seien beispielsweise zu nennen: Die Reduktion mit Hydrazin in Wasser und/oder Alkoholen wie beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol, bevorzugt in Anwesenheit von Katalysatoren wie Platin, Palladium oder Palladium auf Tierkohle in einem Temperaturbereich von 0° C bis +150° C, bevorzugt von +20° C bis +100° C.

Die Reduktion mit Lithiumaluminiumhydrid in inerten Lösemitteln wie Ether z.B. Diethylether, Dioxan oder Tetrahydrofuran, oder Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol oder Xylol, oder Chlorkohlenwasserstoffe wie Methylenchlorid, Chloroform oder Tetrachlorkohlenstoff in einem Temperaturbereich von -30° C bis +150° C, bevorzugt von 0° C bis +80° C oder


Reduktion mit Zink in Wasser und/oder Alkoholen wie Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol in Anwesenheit von Säuren wie Salzsäure oder Essigsäure.

Ebenso können die erfindungsgemäß verwendeten Amine hergestellt werden, wie es beispielsweise in DE-A-1 36 07 382 beschrieben wird.

Als Amine werden beispielsweise erfindungsgemäß verwendet:

- 8-(2-Aminophenoxy)chinolin
- 7-(4-Aminophenoxy)chinolin
- 8-(4-Aminophenoxy)chinolin
- 8-(3-Aminophenoxy)chinolin
- 8-(4-Aminophenoxy)-4-methyl-chinolin
- 8-(4-Amino-2-chlorphenoxy)chinolin
- 8-(4-Aminophenoxy)-6-methyl-chinolin
- 8-(2-Aminophenoxy)-4-methyl-chinolin
- 6-(2-Aminophenoxy)chinolin
- 2-(4-Aminophenoxy)methyl)chinolin
- 2-(2-Aminophenoxy)methyl)chinolin
- 2-(3-Aminophenoxy)methyl)chinolin
- 2-(4-Amino-2-cyano-phenoxy)methyl)chinolin
- 2-[1-(4-Aminophenoxy)ethyl]chinolin
- 2-(4-Amino-2-ethoxycarbonyl-phenoxy)methyl)chinolin
- 8-(2-Aminobenzyloxy)chinolin
- 8-(3-Aminobenzyloxy)chinolin
- 2-[N-(3-Aminobenzyl)-N-methyl]aminopyridin
- 2-[2-(N-3-aminobenzyl-N-methyl)aminoethyl]pyridin


Die als Ausgangsstoffe eingesetzten Nitroverbindungen der allgemeinen Formel (IV), wobei a) Nitroverbindungen, in welchen R¹ und R² die angegebene Bedeutung haben und X für -O- steht, R¹ jedoch nicht für einen Pyridylrest steht, der allgemeinen Formel (IVa)



(IVa)


entsprechen und wobei

b) Nitroverbindungen, in welchen R¹ und R² die angegebene Bedeutung haben und X für -A-B- steht, der allgemeinen Formel (IVb)



10 entsprechen und wobei


c) Nitroverbindungen in welchen R¹ und R² die angegebene Bedeutung haben und X für -B-A steht, der allgemeinen Formel (IVc)



20 entsprechen,

können hergestellt werden, indem man

Fluornitrophenylverbindungen der allgemeinen Formel (V)




30 in welcher R³ die angegebene Bedeutung hat, mit Alkoholen der allgemeinen Formel (VI)

R¹-OH (VI)

35 in welcher R¹ die angegebene Bedeutung hat aber nicht für einen Pyridylrest stehen darf, in geeigneten Lösemitteln in Anwesenheit von Basen umgesetzt.

Die Reaktion kann durch folgendes Formelschema verdeutlicht werden:



20 Als Lösemittel eignen sich die üblichen organischen Lösemittel, die sich unter den Reaktionsbedingungen nicht verändern. Hierzu gehören bevorzugt Ether, wie beispielsweise Dioxan, Tetrahydrofuran oder Diethylether, oder Chlorkohlenwasserstoffe wie Methylenchlorid, Trichlormethan oder Tetrachlormethan, oder Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol, Xylol, Hexan, Cyclohexan, oder Erdölfraktionen, oder Amide wie Dimethylformamid oder Hexamethylphosphorsäuretriamid, oder Pyridin. Ebenso ist es möglich, Gemische der genannten Lösemittel einzusetzen.

25 Als Basen können die üblichen anorganischen oder organischen Basen eingesetzt werden. Hierzu gehören vorzugsweise Alkalihydroxide wie beispielsweise Natriumhydroxid oder Kaliumhydroxid, oder Erdalkalihydroxide wie beispielsweise Bariumhydroxid, oder Alkalicarbonate wie Natriumcarbonat oder Kaliumcarbonat, oder Erdalkalicarbonate wie Calciumcarbonat, oder organische Amine wie Triethylamin, Pyridin oder Methylpiperidin.

30 Das Verfahren wird im allgemeinen in einem Temperaturbereich von 0° C bis +150° C, bevorzugt von +20° C bis +100° C durchgeführt.

Das Verfahren wird im allgemeinen bei Normaldruck durchgeführt, es ist aber auch möglich das Verfahren bei Unterdruck oder bei Überdruck durchzuführen (z.B. in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar).

35 Im allgemeinen setzt man 0,5 bis 2 Mol, bevorzugt 1 Mol Alkohol bezogen auf 1 Mol Fluornitrophenylverbindung ein.

Als Fluornitrophenylverbindungen werden beispielsweise erfindungsgemäß verwendet:

- 2-Fluornitrobenzol,
- 3-Fluornitrobenzol,
- 40 4-Fluornitrobenzol.


Als Alkohole werden beispielsweise erfindungsgemäß verwendet:

- 2-Hydroxychinolin,
- 4-Hydroxychinolin,
- 5-Hydroxychinolin,
- 45 8-Hydroxychinolin,
- 1-Hydroxyisochinolin,
- 5-Hydroxyisochinolin,
- 2-Hydroxy-4-methyl-chinolin,
- 8-Hydroxy-4-methyl-chinolin,
- 50 8-Hydroxy-6-methyl-chinolin.

Die als Ausgangsstoffe verwendeten Verbindungen der allgemeinen Formel (V) und (VI) sind bekannt.

Die Verbindungen der allgemeinen Formel (IVb) werden hergestellt, indem man

Nitrophenylverbindungen der allgemeinen Formel (VII)




in welcher
10 R² und A die angegebene Bedeutung haben,
mit Halogeniden der allgemeinen Formel (VIII)
Hal-B-R¹ (VIII)

in welcher
15 R¹ und B die angegebene Bedeutung haben
und

Hal - für Chlor, Brom oder Iod steht,

in geeigneten Lösemitteln, gegebenenfalls in Anwesenheit einer Base umgesetzt.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann beispielsweise durch das folgende Formelschema erläutert werden:



Als Lösemittel eignen sich die üblichen organischen Lösemittel, die sich unter den Reaktionsbedingungen nicht verändern. Hierzu gehören vorzugsweise Alkohole wie beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol, oder Ether wie beispielsweise Dioxan, Tetrahydrofuran oder Diethylether, oder Chlorkohlenwasserstoffe wie beispielsweise Dichlormethan, Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan oder Trichlorethylen, oder Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Xylol, Toluol, Hexan, Cyclohexan, oder Erdölfractionen, oder Nitromethan, Dimethylformamid, Acetonitril, Aceton oder Hexamethylphosphorsäuretriäthylamid. Ebenso ist es möglich, Gemische der genannten Lösemittel einzusetzen.

Als Basen eignen sich anorganische oder organische Basen. Hierzu gehören vorzugsweise Alkalihydroxide wie beispielsweise Natriumhydroxid oder Kaliumhydroxid, oder Erdalkalihydroxide wie Bariumhydroxid, oder Alkalicarbonat wie beispielsweise Natriumcarbonat oder Kaliumcarbonat, oder Erdalkalicarbonat wie Calciumcarbonat oder organische Amine wie beispielsweise Triethylamin, Pyridin, Methylpiperidin, Piperidin oder Morpholin.

Es ist auch möglich, als Basen Alkalimetalle wie Natrium, oder deren Hydride wie Natriumhydrid einzusetzen.

Das Verfahren wird im allgemeinen in einem Temperaturbereich von 0° C bis +150° C, bevorzugt von +10° C bis +100° C durchgeführt.

Das Verfahren wird im allgemeinen bei Normaldruck durchgeführt. Es ist aber auch möglich, das Verfahren bei Unterdruck oder Überdruck durchzuführen (z.B. in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar).

Im allgemeinen setzt man 0,5 bis 5, bevorzugt 1 bis 2 Mol Halogenid bezogen auf 1 Mol Nitrophenylverbindung ein. Die Base wird im allgemeinen in einer Menge von 0,5 bis 5 Mol, bevorzugt von 1 bis 3 Mol, bezogen auf das Halogenid eingesetzt.

Als Nitrophenylverbindungen werden beispielsweise erfindungsgemäß verwendet:

- 5 2-Nitrophenol,
- 3-Nitrophenol,
- 4-Nitrophenol.


Als Halogenide werden beispielsweise erfindungsgemäß verwendet:

- 8-Chlormethyl-chinolin,
- 10 7-Chlormethyl-chinolin,
- 2-Chlormethyl-chinolin,
- 2-Chlormethyl-pyridin,
- 3-Chlormethyl-pyridin,
- 4-Chlormethyl-pyridin,
- 15 2-Chlormethyl-4-methyl-chinolin,
- 8-Chlormethyl-6-methyl-chinolin.

Die Ausgangsverbindungen (VII) und (VIII) sind bekannt.

Die Verbindungen der allgemeinen Formel (IVc) werden hergestellt indem man

- 20 Verbindungen der allgemeinen Formel (IX)



30

in welcher

R² und B die oben angegebene Bedeutung haben
und

Hal - für Chlor, Brom oder Iod steht

- 35 mit Verbindungen der allgemeinen Formel (X)

H-A-R¹ (X)

in welcher

A und R¹ die oben angegebene Bedeutung haben,


in geeigneten Lösemitteln, gegebenenfalls in Anwesenheit einer Base umgesetzt.

- 40 Das Verfahren kann beispielsweise durch das folgende Formelschema erläutert werden:

45

50

55



Lösemittel, Basen sowie die Bedingungen zur Durchführung des Verfahrens zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel (IVc) wurden bereits ausführlich für das Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel (IVb) beschrieben.

Als Halogenide werden beispielsweise erfindungsgemäß verwendet:

- 2-Chlormethyl-nitrophenol,
- 3-Chlormethyl-nitrophenol,
- 4-Chlormethyl-nitrophenol.

Als Hydroxyverbindungen wurden beispielsweise erfindungsgemäß verwendet:

- 2-Hydroxy-chinolin,
- 3-Hydroxy-chinolin,
- 5-Hydroxy-chinolin,
- 6-Hydroxy-chinolin,
- 8-Hydroxy-chinolin,
- 2-Hydroxy-pyridin,
- 3-Hydroxy-pyridin,
- 4-Hydroxy-pyridin,
- 5-Hydroxy-4-methyl-chinolin,
- 8-Hydroxy-4-methyl-chinolin.

Die als Ausgangsstoffe verwendeten Verbindungen der allgemeinen Formel (IX) und (X) sind bekannt.

Die erfindungsgemäßen substituierten Phenylsulfonamide können als Wirkstoffe in Arzneimitteln eingesetzt werden. Die neuen Stoffe wirken als Hemmer (Stimulatoren) von enzymatischen Reaktionen im Rahmen des Arachidonsäurestoffwechsels, insbesondere der Lipxygenase. Darüberhinaus wirken sie thrombozytenaggregationshemmend.

Sie sind somit bevorzugt zur Behandlung und Verhütung von Erkrankungen der Atemwege wie Allergien/Asthma, Bronchitis, Emphysem, Schocklunge, Pulmonarer Hypertonie, Entzündungen, Rheuma, Ödemen, Thrombosen, Thromboembolien, Ischämien (periphere, cardiale, cerebrale Durchblutungsstörungen), Herz-und Hirninfarkten, Herzrhythmusstörungen, Angina Pectoris, Arteriosklerose, bei Gewebstransplantationen, Dermatosen wie Psoriasis, Metastasen und zur Cytoprotektion im Gastrointestinal-Trakt geeignet.

Die neuen Wirkstoffe können in bekannter Weise in die üblichen Formulierungen überführt werden, wie Tabletten, Dragees, Pillen, Granulate, Aerosole, Sirupe, Emulsionen, Suspensionen und Lösungen, unter Verwendung inerter, nicht toxischer, pharmazeutisch geeigneter Trägerstoffe oder Lösungsmittel. Hierbei soll die therapeutisch wirksame Verbindung jeweils in einer Konzentration von etwa 0,5 bis 90-Gew.-% der Gesamtmischung vorhanden sein, d.h. in Mengen, die ausreichend sind, um den angegebenen Dosierungsspielraum zu erreichen.

Die Formulierungen werden beispielsweise hergestellt durch Verstrecken der Wirkstoffe mit Lösungsmitteln und/oder Trägerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung von Emulgiermitteln und/oder Dispergiermitteln, wobei z.B. im Fall der Benutzung von Wasser als Verdünnungsmittel gegebenenfalls organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden können.

Als Hilfsstoffe seien beispielsweise aufgeführt: Wasser, nicht-toxische organische Lösungsmittel, wie Paraffine (z.B. Erdölfraktionen), pflanzliche Öle (z.B. Erdnuß/Sesamöl), Alkohole (z.B. Ethylalkohol, Glycerin), Trägerstoffe, wie z.B. natürliche Gesteinsmehle (z.B. Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide), Synthetische Gesteinsmehle (z.B. hochdisperse Kieselsäure, Silikate), Zucker (z.B. Rohr-, Milch- und Traubenzucker), Emulgiermittel (z.B. Polyoxyethylen-Fettsäure-Ester, Polyoxyethylen-Fettalkohol-Ether, Alkylsulfonate, Arylsulfonate), Dispergiermittel (z.B. Lignin-Sulfitablaugen, Methylcellulose, Stärke und Polyvinylpyrrolidon) und Gleitmittel (z.B. Magnesiumstearat, Talkum, Stearinsäure und Natriumlaurylsulfat).

Die Applikation erfolgt in üblicher Weise, vorzugsweise oral oder parenteral, insbesondere perlingual oder intravenös. Im Falle der oralen Anwendung können Tabletten selbstverständlich außer den genannten Trägerstoffen auch Zusätze, wie Natriumcitrat, Calciumcarbonat und Dicalciumphosphat zusammen mit verschiedenen Zuschlagstoffen, wie Stärke, vorzugsweise Kartoffelstärke, Gelatine und dergleichen enthalten. Weiterhin können Gleitmittel, wie Magnesiumstearat, Natriumlaurylsulfat und Talkum zum Tablettieren mitverwendet werden. Im Falle wäßriger Suspensionen können die Wirkstoffe außer den obengenannten Hilfsstoffen mit verschiedenen Geschmacksaufbesserern oder Farbstoffen versetzt werden.

Für den Fall der parenteralen Anwendung können Lösungen der Wirkstoffe unter Verwendung geeigneter flüssiger Trägermaterialien eingesetzt werden.

Im allgemeinen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, bei intravenöser Applikation Mengen von etwa 0,001 bis 1 mg/kg, vorzugsweise etwa 0,01 bis 0,5 mg/kg Körpergewicht zur Erzielung wirksamer Ergebnisse zu verabreichen, und bei oraler Applikation beträgt die Dosierung etwa 0,01 bis 20 mg/kg, vorzugsweise 0,1 bis 10 mg/kg Körpergewicht.

Trotzdem kann es gegebenenfalls erforderlich sein, von den genannten Mengen abzuweichen, und zwar in Abhängigkeit vom Körpergewicht bzw. der Art des Applikationsweges, vom individuellen Verhalten gegenüber dem Medikament, der Art von dessen Formulierung und dem Zeitpunkt bzw. Intervall, zu welchen die Verabreichung erfolgt. So kann es in einigen Fällen ausreichend sein, mit weniger als der vorgenannten Mindestmenge auszukommen, während in anderen Fällen die genannte obere Grenze überschritten werden muß. Im Falle der Applikation größerer Mengen kann es empfehlenswert sein, diese in mehreren Einzelgaben über den Tag zu verteilen.

Die erfindungsgemäßen substituierten Phenylsulfonamide können sowohl in der Humanmedizin als auch in der Veterinärmedizin eingesetzt werden.

35

Herstellungsbeispiele

Die Retentionszeiten R_t (min) werden mit einem HPLC-Gerät (Fa. Knauer) an Hibar-Säulen (Fa. Merck) ermittelt.

40

System a: RP-8, 7 μ m

Durchfluß: 2 ml/min


Eluens: Acetonitril/Wasser = 70:30 (v/v)

45

Beispiel 1

8-(2-Nitrophenoxy)chinolin

50



55

29 g 8-Hydroxychinolin und 28 g wasserfreies Kaliumcarbonat werden 1 h bei 25° C in 400 ml

Dimethylformamid gerührt. Es werden 21 ml 2-Fluor-nitrobenzol, gelöst in 100 ml Dimethylformamid, zugetropft, und das Reaktionsgemisch wird 15 h bei 25° C gerührt. Das Lösungsmittel wird im Vakuum abgedampft, der Rückstand in Essigester aufgenommen und dreimal mit Wasser gewaschen. Nach Trocknen über Natriumsulfat wird das Lösungsmittel im Vakuum abgedampft und der Rückstand aus

Methanol umkristallisiert.


Ausbeute: 82% der Theorie

Fp. : 113 - 114° C (Methanol)

Analog Beispiel 1 wurden hergestellt:

Beispiel 2

8-(4-Nitrophenoxy)chinolin




Ausbeute: 80%

Fp. : 165 - 166° C (Methanol)

Beispiel 3

8-(3-Nitrophenoxy)chinolin



Ausbeute: 58% der Theorie

Fp. : 133 - 134° C (Methanol)


Beispiel 4

4-Methyl-8-(4-nitrophenoxy)chinolin

5

10

15



20 Ausbeute: 88% der Theorie
Fp. : 148 - 149° C (Methanol)


Beispiel 5

25

8-(2-Chlor-4-nitrophenoxy)chinolin

30

35



40

Ausbeute: 89% der Theorie
Fp. : 113 - 115° C (Ethanol)

45

50

55


Beispiel 6

6-Methyl-8-(4-nitrophenoxy)chinolin

5

10

15



Ausbeute: 60% der Theorie

Fp. : 143° C (Ethanol)

20


Beispiel 7

4-Methyl-8-(2-nitrophenoxy)chinolin

25

30

35



Ausbeute: 69% der Theorie

Fp. : 98 - 99° C (Ethanol/Wasser)

40

Beispiel 8

6-(2-Nitrophenoxy)chinolin

45

50

55



Ausbeute: 86% der Theorie

Fp. : 114 - 116° C (Ethanol)


Beispiel 9

2-(4-Nitrophenoxy)methyl)chinolin

5

10

15



28 g 4-Nitrophenol und 55 g wasserfreies Kaliumcarbonat werden 1 h bei 25° C in 300 ml Dimethylformamid gerührt. Nach Zutropfen einer Suspension von 53 g 2-Chlorphenylchinolin-hydrochlorid in 100 ml Dimethylformamid wird 15 h bei 40 - 50° C gerührt. Nach Abdampfen des Lösemittels wird der Rückstand mit Wasser verrührt, abgesaugt und aus Methanol umkristallisiert.

Ausbeute: 91% der Theorie

Fp. : 144 - 145° C (Methanol)

Analog Beispiel 9 wurden hergestellt:

25


Beispiel 10

2-(2-Nitrophenoxy)methyl)chinolin

30

35

40



Ausbeute: 83% der Theorie

Fp. : 121 - 122° C (Methanol)

45

50

55


Beispiel 11

2-(3-Nitrophenoxy)methyl)chinolin

5

10

15



Ausbeute: 94% der Theorie
Fp. : 109° C (Methanol)

20


Beispiel 12

2-(2-Cyano-4-nitrophenoxy)methyl)chinolin

25

30

35



Ausbeute: 50% der Theorie
Fp. : 161 - 162° C (Methanol)

40


Beispiel 13

2-[1-(4-Nitrophenoxy)ethyl]chinolin

45

50

55



Ausbeute: 75% der Theorie

$R_f = 2.07$ (System a)


Beispiel 14

5

2-(2-Ethoxycarbonyl-4-nitrophenoxy)methyl)chinolin

10

15



20

Ausbeute: 40% der Theorie


Fp. : 139 - 140° C (Ethanol)

25 Beispiel 15

8-(2-Nitrobenzyloxy)chinolin

30

35



42 g 8-Hydroxyquinolin und 40 g wasserfreies Kaliumcarbonat werden 1 h bei 25° C in 400 ml Dimethylformamid gerührt. Danach werden 50 g 2-Nitrobenzylchlorid in 150 ml Dimethylformamid zuge-
 40 tropft, die Mischung 15 h bei 25° C gerührt und eingedampft. Der Rückstand wird mit Wasser verrührt, abgesaugt und aus Ethanol umkristallisiert.

Ausbeute: 84% der Theorie

Fp. : 151 - 153° C (Ethanol)

45 Analog Beispiel 15 wurden hergestellt:

50

55


Beispiel 16

8-(3-Nitrobenzyloxy)chinolin

5

10

15



Ausbeute: 70% der Theorie

Fp. : 98 - 99° C (Ethanol)


20

Beispiel 17

2-[N-Methyl-N-(3-nitrobenzyl)aminoethyl]pyridin

25

30



Zu einer Lösung von 5,4 g 2-(2-Methylaminoethyl)pyridin in 20 ml Methanol werden bei 40° C 6,8 g 3-Nitrobenzylchlorid in 25 ml Methanol langsam zugetropft. Anschließend gibt man 15 ml Triethylamin in 15 ml Methanol zu und rührt 15 bei 40° C. Nach Abdampfen des Lösemittels im Vakuum wird der Rückstand in 300 ml Wasser aufgenommen und dreimal mit Dichlormethan extrahiert. Nach Trocknen über Natriumsulfat wird im Vakuum eingedampft und der Rückstand an Kieselgel (Eluens: Dichlormethan / Methanol 100:5) chromatographiert.

Ausbeute: 82% der Theorie

Kp. : 245° C / 0.5 mm (Kugelrohr)


Beispiel 18

45

2-[N-(3-Nitrobenzyl)-N-methyl]aminopyridin

50

55



21,6 g 2-Methylaminopyridin und 34,2 g 3-Nitrobenzylchlorid werden 30 min auf 50° C erwärmt. Nach Zugabe von 3 g Dimethylaminopyridin wird 3 h auf 100° C erwärmt. Nach Abkühlen wird das


Reaktionsgemisch in Dichlormethan aufgenommen und mit 2 N NaOH und Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingengt. Der Rückstand wird über Kieselgel (Eluens: Dichlormethan) chromatografiert. Das Produkt kristallisiert aus.

Ausbeute: 55% der Theorie

5 Fp. : 56 - 57° C

Beispiel 19

10 8-(2-Aminophenoxy)chinolin



35,4 g 8-(2-Nitrophenoxy)chinolin und 3,4 g 10%iges Palladium/Kohle werden unter Stickstoff in 350 ml Methanol suspendiert und erwärmt. Unter Rückfluß werden 27,8 ml Hydrazinhydrat langsam zugetropft, danach wird weitere 2 h im Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen wird der Katalysator abfiltriert und das Lösemittel im Vakuum abgedampft. Der Rückstand wird aus Methanol umkristallisiert.


25 Ausbeute: 69% der Theorie

Fp. : 135° C (Methanol)

Analog Beispiel 19 wurden hergestellt:

30 Beispiel 20

7-(4-Aminophenoxy)chinolin



45

Ausbeute: 72% der Theorie

Fp. : 131° C (Ethanol)

50

55


Beispiel 21

8-(4-Aminophenoxy)chinolin

5

10

15



Ausbeute: 68% der Theorie

Fp. : 204° C (Methanol)

20


Beispiel 22

8-(3-Aminophenoxy)chinolin

25

30

35



Ausbeute: 22% der Theorie

Fp. : 98 - 100° C (Methanol)

40

45

50

55


Beispiel 23

8-(4-Aminophenoxy)-4-methyl-chinolin

5

10

15



20 Ausbeute: 71% der Theorie
Fp. : 157 - 159° C (Ethanol)


Beispiel 24

25

8-(4-Amino-2-chlorphenoxy)chinolin

30

35



40

Ausbeute: 28% der Theorie
Fp. : 181 - 182° C

45

50

55


Beispiel 25

8-(4-Aminophenoxy)-6-methyl-chinolin

5

10

15



Ausbeute: 77% der Theorie

Fp. : 184 - 185° C (Ethanol)

20


Beispiel 26

8-(2-Aminophenoxy)-4-methyl-chinolin

25

30

35



Ausbeute: 84% der Theorie

Fp. : 160 - 161° C (Ethanol)


40

Beispiel 27

6-(2-Aminophenoxy)chinolin

45

50



Ausbeute: 74% der Theorie

Fp. : 115 - 117° C (Ethanol)

55


Beispiel 28

2-(4-Aminophenoxymethyl)chinolin

5

10

15



Ausbeute: 64% der Theorie
Fp. : 126 - 128° C (Methanol)


20

Beispiel 29

2-(2-Aminophenoxymethyl)chinolin

25

30



Ausbeute: 71% der Theorie
Fp. : 66 - 69° C, (i-Propanol)


Beispiel 30

40

2-(3-Aminophenoxymethyl)chinolin

45

50



Ausbeute: 67% der Theorie
Fp. : 98 - 99° C (Methanol)


Beispiel 31

2-(4-Amino-2-cyano-phenoxy)methyl)chinolin

5

10

15



Ausbeute: 49% der Theorie

Fp. : 156° C

20


Beispiel 32

2-[1-(4-Aminophenoxy)ethyl]chinolin

25

30

35



Ausbeute: 95% der Theorie

40

Fp. : 86 - 88° C


Beispiel 33

45

2-(4-Amino-2-ethoxycarbonyl-phenoxy)methyl)chinolin

50

55




Ausbeute: 57% der Theorie
Fp. : 93 - 95° C

5 Beispiel 34

8-(2-Aminobenzzyloxy)chinolin

10

15




20 Ausbeute: 60% der Theorie
Fp. : 103 - 105° C (Essigester)

Beispiel 35

25 8-(3-Aminobenzzyloxy)chinolin

30

35




40 Ausbeute: 74% der Theorie
Fp. : 146 - 147° C (Ethanol)

Beispiel 36

45 2-[N-(3-Aminobenzyl)-N-methyl]aminopyridin

50

55




Ausbeute: 92% der Theorie
 $R_f = 1.64$ (System a)

Beispiel 37

2-[2-(N-3-aminobenzyl-N-methyl)aminoethyl]pyridin

5

10



Ausbeute: 64% der Theorie


15 $R_f = 0,26$ ($\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}$ 10:1)Beispiel 38

20

N-[2-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

25

30



3,54 g 8-(2-Aminophenoxy)chinolin werden in 70 ml Dichlormethan gelöst und bei 25° C mit einer Lösung von 3,17 g 4-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid in 30 ml Dichlormethan versetzt. Nach 1 h werden 2,42 ml Pyridin zugegeben und 15 h bei 25° C gerührt. Nach Abdampfen des Lösemittels wird der Rückstand mit Wasser verrührt. Das Produkt wird abfiltriert und aus Ethanol umkristallisiert. Ausbeute: 94% der Theorie

35

Fp. : 135 - 137° C (Ethanol)


Analog Beispiel 38 wurden hergestellt:

40 Beispiel 39

N-[2-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

45

50



55 Ausbeute: 68% der Theorie


 $R_f = 2,89$ (System a)

Beispiel 40

N-[2-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]butansulfonamid

5

10



Ausbeute: 51% der Theorie

15


Fp. : 87 - 88° C

Beispiel 41

20

N-[2-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid

25



30

Ausbeute: 50% der Theorie

 $R_f = 2.00$ (System a)


35

Beispiel 42

N-[2-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid

40

45



50

Ausbeute: 46% der Theorie

Fp. : 243 - 244° C (Methanol)

55


Beispiel 43

N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

5

10

15



Ausbeute: 91% der Theorie

Fp. : 220° C (Methanol)


20

Beispiel 44

N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

25

30



Ausbeute: 66% der Theorie

Fp. : 186° C (Methanol)


40

Beispiel 45

N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]butansulfonamid

45

50



Ausbeute: 65% der Theorie

Fp. : 162° C (Methanol)


55

Beispiel 46

N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid

5

10



Ausbeute: 69% der Theorie

75 Fp. : 161 - 162° C (Methanol)


Beispiel 47

20

N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid

25

30



35

Ausbeute: 76% der Theorie

Fp. : 181 - 183° C (Methanol)


40

Beispiel 48

N-[4-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

45

50



55

Ausbeute: 61% der Theorie

Fp. : 190 - 191° C (Ethanol)


Beispiel 49

N-[3-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

5

10

15



Ausbeute: 53% der Theorie
 Fp. : 171 - 173° C (Ethanol)

20


Beispiel 50

N-[3-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid

25

30

35



Ausbeute: 51% der Theorie
 Fp. : 201 - 202° C (Methanol)

40


Beispiel 51

N-[3-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid

45

50

55



Ausbeute: 66% der Theorie

Fp. : 138 - 140° C (Ethanol)


Beispiel 52

5

N-[3-(Chinolin-8-yloxy)phenyl]butansulfonamid

10

15



20

Ausbeute: 56% der Theorie

Fp. : 107 - 108° C (Diisopropylether)


Beispiel 53

25

N-[4-(Chinolin-7-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

30

35



40

Ausbeute: 93% der Theorie

Fp. : 208° C (Methanol)


Beispiel 54

45

N-[4-(Chinolin-7-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

50

55



Ausbeute: 64% der Theorie


Fp. : 190° C (Methanol)

5 Beispiel 55

N-[4-(Chinolin-7-yloxy)phenyl]butansulfonamid

10

15



20

Ausbeute: 70% der Theorie

Fp. : 168° C (Methanol)

25 Beispiel 56

N-[4-(Chinolin-7-yloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid

30

35



40

Ausbeute: 75% der Theorie


Fp. : 175 - 176° C (Methanol)

45 Beispiel 57

N-[4-(Chinolin-7-yloxy)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid

50


55



Ausbeute: 61% der Theorie
Fp. : 175 - 178° C (Methanol)

5 Beispiel 58


N-[4-(4-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid



25 Ausbeute: 94% der Theorie
Fp. : 223 - 224° C (Methanol)

Beispiel 59

30 N-[4-(4-Methylquinolin-8-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid



Ausbeute: 70% der Theorie
Fp. : 202 - 203° C


Beispiel 60

N-[4-(4-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]butansulfonamid

5

10

15



20 Ausbeute: 81% der Theorie
 Fp. : 208 - 209° C (Ethanol)


Beispiel 61

25

N-[4-(Chinolin-8-yloxy)-3-chlorphenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

30

35



40

Ausbeute: 90% der Theorie
 Fp. : 198 - 199° C (Ethanol)


45

50

55

Beispiel 62

N-[4-(Chinolin-8-yloxy)-3-chlorphenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamide




Ausbeute: 88% der Theorie

Fp. : > 245° C (Methanol)

Beispiel 63

N-[4-(6-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]butansulfonamid




Ausbeute: 88% der Theorie

Fp. : 189 - 190° C (Ethanol)

Beispiel 64

N-[4-(6-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfoamid



Ausbeute: 94% der Theorie

Fp. : > 245° C


5 Beispiel 65

N-[2-(4-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

10

15

20



Ausbeute: 80% der Theorie

Fp. : 123 - 125° C (Methanol)

25


Beispiel 66

N-[2-(4-Methylchinolin-8-yloxy)phenyl]-butansulfonamid

30

35

40



Ausbeute: 62% der Theorie

R_t = 2.21 (System a)

45

50

55


Beispiel 67

N-[4-(Chinoly-6-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzol-sulfonamid

5

10

15



Ausbeute: 33% der Theorie
 Fp. : > 255° C

20


Beispiel 68

N-[4-(Chinolin-6-yloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

25

30

35



Ausbeute: 60% der Theorie
 Fp. : 142 - 143° C (Methanol)

40


Beispiel 69

N-[4-(Chinolin-6-yloxy)phenyl]butansulfonamide

45

50

55




Ausbeute: 84% der Theorie
 Fp. : 170° C (Methanol)

Beispiel 70

N-[2-(Chinolin-6-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

5

10



15

Ausbeute: 84% der Theorie
Fp. : 151 - 152° C (Ethanol)


Beispiel 72

20

N-[2-(Chinolin-6-yloxy)phenyl]butansulfonamid

25

30



Ausbeute: 62% der Theorie
Fp. : 131 - 133° C (Ethanol)

35


Beispiel 72

N-[4-(4-Methylchinolin-2-yloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

40

45

50



Ausbeute: 88% der Theorie
Fp. : 174 - 176° C (Methanol)

55

Beispiel 73

N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

5

10

15

Ausbeute: 82% der Theorie
Fp. : 125° C (Methanol)

20

Beispiel 74

N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

25

30

35

Ausbeute: 93% der Theorie
Fp. : 81 - 83° C (Methanol)

40

Beispiel 75




N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]butansulfonamid

45

50

55

Ausbeute: 77% der Theorie
Fp. : 113° C (Ethanol)




Beispiel 76

N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid

5

10



Ausbeute: 74% der Theorie
Fp. : 117° C (Methanol)

15


Beispiel 77

N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]pentafluorbenzolsulfonamid

20

25

30



Ausbeute: 37% der Theorie
Fp. : 170 - 178° C (Toluol)


Beispiel 78

40

N-[4-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-1-methylbutansulfonamid

45

50



55


Ausbeute: 70% der Theorie
R_f = 1.68 (System a)

Beispiel 79

N-[2-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

5

10



Ausbeute: 82% der Theorie
 Fp. : 129 - 130° C (Methanol)


15

Beispiel 80

N-[2-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

20

25



30

Ausbeute: 79% der Theorie
 Fp. : 154-155° C (Methanol)

35

Beispiel 81

N-[2-(Chinolin-2-yl-methoxy)phenyl]butansulfonamid

40

45




Ausbeute: 40% der Theorie
 Fp. : 93 - 94° C (Methanol)

50

55

Beispiel 82

N-[2-(Chinolin-2-yl-methyloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid




Ausbeute: 67% der Theorie

Fp. : 100 - 101° C (Methanol)

Beispiel 83

N-[3-(Chinolin-2-yl-methyloxy)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid




Ausbeute: 85% der Theorie

Fp. : 157 - 159° C (Isopropanol)

Beispiel 84

N-[3-(Chinolin-2-yl-methyloxy)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid Hydrochlorid



Ausbeute: 81% der Theorie

Fp. : 183 - 187° C (Isopropanol)


Beispiel 85

N-[3-(Chinolin-2-yl-methyloxy)phenyl]butansulfonamid

5

10

15



Ausbeute: 67% der Theorie

Fp. : 105 - 106° C (Isopropanol)

20


Beispiel 86

N-[3-(Chinolin-2-yl-methyloxy)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid

25

30

35



Ausbeute: 90% der Theorie

Fp. : 116 - 117° C (Isopropanol)

40


Beispiel 87

N-{4-[1-(Chinolin-2-yl-ethyloxy)]phenyl}butansulfonamid

45

50

55



Ausbeute: 89% der Theorie

 $R_1 = 1.80$ (System a)


Beispiel 88

N-[4-(Chinolin-2-yl)methoxy-3-cyano-phenyl]butansulfonamid

5

10

15



Ausbeute: 43% der Theorie

Fp. : 158 -160° C (Isopropanol)

20


Beispiel 89

N-[3-Ethoxycarbonyl-4-(chinolin-2-yl)methoxy-phenyl]butansulfonamid

25

30

35



Ausbeute: 33% der Theorie

Fp. : 90 - 92° C

40


Beispiel 90

N-[2-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

45

50

55



Ausbeute: 31% der Theorie

Fp. : 136 - 137° C


Beispiel 91

N-[3-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

5

10

15



Ausbeute: 81% der Theorie
 Fp. : 201 - 202° C (Methanol)

20


Beispiel 92

N-[3-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

25

30

35



Ausbeute: 60% der Theorie
 Fp. : 210 - 212° C (Ethanol)

40


Beispiel 93

N-[3-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]butansulfonamid

45

50

55



Ausbeute: 42% der Theorie

Fp. : 136 - 137° C (Ethanol)


Beispiel 94

5

N-[3-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid

10

15



20

Ausbeute: 88% der Theorie
Fp. : 206 - 207° C (Ethanol)


Beispiel 95

25

N-[2-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]butansulfonamid

30

35



40

Ausbeute: 56% der Theorie
Fp. : 88 - 89° C (Ethanol)


Beispiel 96

45

N-[2-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

50

55




Ausbeute: 81% der Theorie
Fp. : 120 - 121° C (Ethanol)

5 Beispiel 97

N-[2-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid

10

15



20

Ausbeute: 57% der Theorie
Fp. : 96 - 97° C


Beispiel 98

25

N-[3-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid

30

35



40

Ausbeute: 72% der Theorie
Fp. : 142 - 143° C (Ethanol)


Beispiel 99

45

N-[2-(Chinolin-8-yloxymethyl)phenyl]-4-fluorbenzolsulfonamid

50

55




Ausbeute: 95% der Theorie
Fp. : 121 - 122° C (Ethanol)

Beispiel 100

N,N',N'-[3-(Methyl-2-pyridyl-aminomethyl)phenyl]butansulfonamid

5

10



Ausbeute: 78% der Theorie


15 $R_1 = 1.80$ (System a)Beispiel 101

20

N,N',N'-[3-(Methyl-2-pyridyl-aminomethyl)phenyl]-3-chlorpropansulfonamid

25

30



Ausbeute: 71% der Theorie

Fp. : 63 - 65° C


35

Beispiel 102

N,N',N'-[3-(Methyl-2-pyridyl-aminomethyl)phenyl]-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

40

45



50 Ausbeute: 81% der Theorie

Fp. : 194 - 197° C


55

Beispiel 103

N,N',N'-[3-(Methyl-2-pyridyl-aminomethyl)phenyl]-4-chlorbenzolsulfonamid

5

10



Ausbeute: 70% der Theorie

15

Fp. : 113 - 114° C


Beispiel 104

20

N,N',N'-{3-[[Methyl-2-(2-pyridyl)ethyl]aminomethyl]phenyl}-4-chlorbenzolsulfonamid

25

30



Ausbeute: 74% der Theorie

35


 $R_f = 0,58$ ($\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}$ 10:1)Beispiel 105

40

N,N',N'-{3-[Methyl-2-(2-pyridyl)ethyl]aminomethylphenyl}-3-trifluormethylbenzolsulfonamid

45

50



Ausbeute: 73% der Theorie

55


 $R_f = 0,59$ ($\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}$ 10:1)

Beispiel 106

N,N',N'-{3-[[Methyl-2-(2-pyridyl)ethyl]aminomethyl]phenyl}butansulfonamid

5

10



Ausbeute: 35% der Theorie
 15 $R_f = 0,58$ ($\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}$ 10:1)

Anwendungsbeispiele20 Beispiel 107

(Thrombozytenaggregationshemmung)

Zur Bestimmung der thrombozytenaggregationshemmenden Wirkung wurde Blut von gesunden Probanden beiderlei Geschlechts verwendet. Als Antikoagulans wurden einem Teil 3,8%iger wäßriger Natriumzitratlösung 9 Teile Blut zugemischt. Mittels Zentrifugation erhält man aus diesem Blut plättchenreiches Zitratplasma (PRP) (Jürgens/Beller, Klinische Methoden der Blutgerinnungsanalyse; Thieme Verlag, Stuttgart, 1959).

Für diese Untersuchungen wurden 0,8 ml PRP und 0,1 ml der Wirkstofflösung bei 37° C im Wasserbad vorinkubiert. Anschließend wurde die Thrombozytenaggregation nach der turbidometrischen Methode (Born, G.V.R., J. Physiol. (London), 162, 67, 1962) im Aggregometer bei 37° C bestimmt (Therapeutische Berichte 47, 80-86, 1975). Hierzu wurde die vorinkubierte Probe mit 0,1 ml Kollagen, einem aggregationsauslösenden Agens, versetzt. Die Veränderung der optischen Dichte in der Probe der PRP wurde während einer Zeitdauer von 6 Minuten aufgezeichnet und der Ausschlag nach 6 Minuten bestimmt. Hierzu wird die prozentuale Hemmung gegenüber der Kontrolle errechnet.

Als Grenzkonzentration wird der Bereich der minimal effektiven Konzentration angegeben (Tabelle 1).

Tabelle 1 Thrombozytenaggregationshemmung

40

<u>Beispiel-Nr.</u>	<u>Hemmung $\mu\text{g/ml}$ (Grenzkonzentration)</u>
38	0,3-0,1
45 43	1,0-0,1
44	10 - 1
45	10 - 1
50 46	1,0 - 0,1
52	10 - 3
58	10 - 3
74	3,0 - 1,0
55 90	1,0 - 0,1

Als Maß für eine Lipoxxygenase-Hemmung wurde die Freisetzung von Leukotrien B₄ (LTB₄) an polymorphkernigen Rattenleukozyten (PMN) nach Zugabe von Substanzen und Ca-Ionophor mittels reverse phase HPLC nach Borgeat, P. et al, Proc. Nat. Acad. Sci. 76, 2148-2152 (1979) bestimmt. Die in vivo-Aktivität der Verbindungen wurde mit dem Mäuseohr-Entzündungsmodell nach Young, J.M. et. al., J. of Investigative Dermatology 82, 367-371 (1984) nachgewiesen.

In den Tabellen 2 und 3 sind beispielhaft die nach diesem Test erzielten Werte einiger erfindungsgemäße Verbindungen aufgeführt:

Tabelle 2 Lipoxxygenasehemmung


Bsp.-Nr.	IC ₅₀ -Wert (g/ml)
53	8.8 x 10 ⁻⁸
54	1.7 x 10 ⁻⁷
57	3.3 x 10 ⁻⁸
73	1.0 x 10 ⁻⁷
74	1.0 x 10 ⁻⁷
75	5.7 x 10 ⁻⁸
76	4.6 x 10 ⁻⁸
78	7.4 x 10 ⁻⁸

Tabelle 3 Mouse Ear Inflammation Test

Beispiel	Dosis	Entzündungshemmung %
58	2 mg/Ohr top.	58
75	"	39
78	"	65
44	100 mg/kg p.o.	38
75	"	46
76	"	37

45 Ansprüche

1. Phenylsulfonamide der Formel (I)



in welcher

R¹ -für einen Pyridyl-, Chinolyl-oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Halogen, Alkyl,

Cycloalkyl, Alkoxy, Cyano, Nitro, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkoxycarbonyl oder Alkylsulfonyl,
 R^2 -für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Halogen, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl, Halogenalkoxy oder Alkoxycarbonyl
steht,

R^3 -für einen Arylrest steht, der bis zu dreifach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch
5 Halogen, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Cyano, Nitro oder Alkoxy-carbonyl oder

-für Pentafluorphenyl oder

-für geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl steht, das substituiert sein kann durch Halogen, Aryl,
Aryloxy, Cyano, Alkoxycarbonyl, Alkoxy, Alkylthio oder Trifluormethyl

10 und

X - für eine Gruppierung -O-, -A-B-oder -B-A-steht,


wobei

A - -O-,

15



20 , oder




25

bedeutet und

B - -CH₂-oder

30



bedeutet wobei R^1 nicht für einen Pyridylrest
stehen darf,

35

wenn X für die Gruppierung -O-steht.

und deren Salze.

2. Phenylsulfonamide nach Anspruch 1,

wobei

40 R^1 -für einen Pyridyl-, Chinolyl-oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Brom,
Niederalkyl, Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Niederalkoxy, Cyano, Trifluormethyl, Trifluormethoxy,
Niederalkoxycarbonyl, Niederalkylsulfonyl,

R^2 -für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Fluor, Chlor, Brom, Niederalkyl, Niederalkoxy, Trifluormethyl, Trifluorme-
thoxy, oder Niederalkoxycarbonyl steht,

45 R^3 -für Phenyl steht, das bis zu 2-fach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch Fluor, Chlor,
Brom, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Niederalkyl, Niederalkoxy, Niederalkylthio, Niederalkylsulfonyl,
Cyano, Niederalkoxycarbonyl oder

-für Pentafluorphenyl oder

-für geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen steht, das substituiert
50 sein kann durch Fluor, Chlor, Brom, Phenyl, Phenoxy, Cyano, Niederalkoxy oder Trifluormethyl


und

X - für eine Gruppierung -O-, -A-B-oder -B-A-steht,


wobei

A - -O-,


55



oder



bedeutet und
B - $-\text{CH}_2$ -oder



bedeutet,
wobei R¹ nicht für einen Pyridylrest stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O-steht,
und deren Salze.

3. Phenylsulfonamide nach den Ansprüchen 1 und 2,

wobei

R¹ -für einen Pyridyl-, Chinolyl-oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder durch Trifluormethyl, R² -für Wasserstoff, Cyano, Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluormethyl, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl oder Propoxycarbonyl steht,

R³ -für Phenyl steht, das substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, Alkoxy mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen, Cyano, Alkoxycarbonyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder

-für Pentafluorphenyl oder


-für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen steht, das substituiert sein kann durch Fluor, Chlor oder Phenyl

und

X - für -O-, -OCH₂-, -CH₂O-, -OCH(CH₃)-, CH₂N(CH₃)-, -CH₂N(CH₃)CH₂CH₂-steht

wobei R¹ nicht für einen Pyridylrest stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O-steht
und deren Salze.

4. Phenylsulfonamide der Formel (I)



(I)

in welcher

R¹ -für einen Pyridyl-, Chinolyl-oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Halogen, Alkyl, Cycloalkyl, Alkoxy, Cyano, Nitro, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkoxycarbonyl oder Alkylsulfonyl,

R² -für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Halogen, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl, Halogenalkoxy oder Alkoxycarbonyl steht,

R³ -für einen Arylrest steht, der bis zu dreifach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch Halogen, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Cyano, Nitro oder Alkoxycarbonyl oder

-für Pentafluorphenyl oder


-für geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl steht, das substituiert sein kann durch Halogen, Aryl, Aryloxy, Cyano, Alkoxycarbonyl, Alkoxy, Alkylthio oder Trifluormethyl

und


X - für eine Gruppierung -O-, -A-B-oder -B-A-steht,

wobei

A - -O-,




5 , oder



10

bedeutet und
B - -CH₂-oder

15




20

bedeutet
wobei R¹ nicht für einen Pyridylrest stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O-steht,
und deren Salze,
zur therapeutischen Behandlung.

5. Verfahren zur Herstellung von Phenylsulfonamiden der Formel (I)

25



(I)

30

in welcher

35 R¹ -für einen Pyridyl-, Chinolyl-oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Halogen, Alkyl, Cycloalkyl, Alkoxy, Cyano, Nitro, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkoxycarbonyl oder Alkylsulfonyl,
R² -für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Halogen, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl, Halogenalkoxy oder Alkoxycarbonyl steht,

R³ -für einen Arylrest steht, der bis zu dreifach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch
40 Halogen, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Cyano, Nitro oder Alkoxycarbonyl oder

-für Pentafluorphenyl oder

-für geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl steht, das substituiert sein kann durch Halogen, Aryl, Aryloxy, Cyano, Alkoxycarbonyl, Alkoxy, Alkylthio oder Trifluormethyl


und

45 X - für eine Gruppierung -O-, -A-B-oder -B-A-steht,

wobei


A - -O-,

50



, oder


55



5 bedeutet und
B - -CH₂-oder




bedeutet wobei R¹ nicht für ein Pyridylrest stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O-steht,
und deren Salze,
15 das dadurch gekennzeichnet ist, daß man
Amine der allgemeinen Formel (II)



in welcher
R¹, R² und X die oben angegebene Bedeutung haben, mit Sulfonsäurehalogeniden der allgemeinen Formel
(III)
30 R³-SO₂-Y (III)
in welcher
R³ die oben angegebene Bedeutung hat
und
Y - für Halogen steht
35 in Gegenwart eines inerten Lösemittels, gegebenenfalls in Gegenwart einer Base umgesetzt und dann
gegebenenfalls im Fall der Herstellung der Salze mit einer entsprechenden Säure umgesetzt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung im Temperaturbereich
von -30° C bis +150° C durchführt.

40 7. Arzneimittel, enthaltend ein oder mehrere Phenylsulfonamide der allgemeinen Formel (I)




in welcher
50 R¹ -für einen Pyridyl-, Chinolyl-oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Halogen, Alkyl,
Cycloalkyl, Alkoxy, Cyano, Nitro, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkoxy-carbonyl oder Alkylsulfonyl,
R² -für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Halogen, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl, Halogenalkoxy oder Alkoxy-carbonyl
steht,
R³ -für einen Arylrest steht, der bis zu dreifach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch
55 Halogen, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Cyano, Nitro oder Alkoxy-carbonyl oder
-für Pentafluorphenyl oder
-für geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl steht, das substituiert sein kann durch Halogen, Aryl,

Aryloxy, Cyano, Alkoxycarbonyl, Alkoxy, Alkylthio oder Trifluormethyl
und


X - für eine Gruppierung -O-, -A-B-oder -B-A-steht,
wobei

5 A - -O-,



10


, oder



15

bedeutet und
B - -CH₂-oder

20



25


bedeutet

wobei R¹ nicht für einen Pyridylrest stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O-steht,
und deren Salze.

8. Arzneimittel nach Anspruch 7, enthaltend 0,5 bis 90 Gew.-% Phenylsulfonamide, bezogen auf die
Gesamtmischung.

30

9. Verwendung von Phenylsulfonamiden der Formel



35

(I).

40

in welcher

R¹ -für einen Pyridyl-, Chinolyl-oder Isochinolylrest steht, der substituiert sein kann durch Halogen, Alkyl,
Cycloalkyl, Alkoxy, Cyano, Nitro, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkoxycarbonyl oder Alkylsulfonyl,

R² -für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Halogen, Alkyl, Alkoxy, Halogenalkyl, Halogenalkoxy oder Alkoxycarbonyl
steht,

45

R³ -für einen Arylrest steht, der bis zu dreifach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch
Halogen, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Cyano, Nitro oder Alkoxycar-
bonyl oder

-für Pentafluorphenyl oder


50

-für geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Alkyl steht, das substituiert sein kann durch Halogen, Aryl,
Aryloxy, Cyano, Alkoxycarbonyl, Alkoxy, Alkylthio oder Trifluormethyl
und


X - für eine Gruppierung -O-, -A-B-oder -B-A-steht,
wobei

55

A - -O-,




5 , oder



10

bedeutet und
B - -CH₂-oder

15



20 bedeutet
wobei R¹ nicht für einen Pyridylrest stehen darf, wenn X für die Gruppierung -O-steht,
und deren Salze,
zur Herstellung von Arzneimitteln.

10. Verwendung nach Anspruch 9 zur Herstellung von Lipoxxygenasehemmern.

11. Verwendung nach Anspruch 9 zur Herstellung von Thrombozytenaggregationshemmern.

25 12. Verwendung nach Anspruch 9 zur Herstellung von Arzneimitteln zur Hemmung von enzymatischen
Reaktionen.

30

35

40

45

50

55

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

0 261 539
A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 87113393.0

(22)

Anmeldetag: 14.09.87

(51)

Int. Cl.4: **C07D 215/26** , **C07D 215/20** ,
C07D 215/22 , **C07D 215/14** ,
C07D 213/74 , **C07D 213/38** ,
A61K 31/47 , **A61K 31/44**

(30)

Priorität: 24.09.86 DE 3632329

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
30.03.88 Patentblatt 88/13

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(38)

Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 19.10.88 Patentblatt 88/42

(71)

Anmelder: **BAYER AG**
Konzernverwaltung RP Patentabteilung
D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

(72)

Erfinder: Mohrs, Klaus, Dr.
Claudiusweg 9
D-5600 Wuppertal 1(DE)
Erfinder: Perzborn, Elisabeth, Dr.
Am Tescher Busch 13
D-5600 Wuppertal 11(DE)
Erfinder: Seuter, Friedel, Dr.
Moospfad 16
D-5600 Wuppertal 1(DE)
Erfinder: Fruchtmann, Romanis, Dipl.-Biologin
Konrad-Adenauer-Ufer 71
D-5000 Köln 1(DE)
Erfinder: Kohlsdorfer, Christian, Dr.
Franz-Stryck-Strasse 16
D-5042 Erftstadt(DE)


(54)

Substituierte Phenylsulfonamide.

(57)

Die Verbindungen (I) können als Wirkstoffe zur
Hemmung von enzymatischen Reaktionen und zur
Hemmung der Thrombozytenaggregationen einge-
setzt werden.

EP 0 261 539 A3



(I)

in welcher

R¹ - für einen Pyridyl-, Chinolyl-oder Isochinolylrest
steht, der substituiert sein kann durch Halogen, Al-
kyl, Cycloalkyl, Alkoxy, Cyano, Nitro, Halogenalkyl,
Halogenalkoxy, Alkoxy-carbonyl oder Alkylsulfonyl,

R² - für Wasserstoff, Cyano, Nitro, Halogen, Alkyl,
Alkoxy, Halogenalkyl, Halogenalkoxy oder Alkoxy-car-
bonyl steht,

R³ - für einen Arylrest steht, der bis zu dreifach
gleich oder verschieden substituiert sein kann durch
Halogen, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Alkyl, Alkoxy,
Alkylthio, Alkylsulfonyl, Cyano, Nitro oder Alkoxy-car-
bonyl oder


- für Pentafluorphenyl oder

- für geradkettiges, verzweigtes oder cyclisches Al-
kyl steht, das substituiert sein kann durch Halogen,
Aryl, Aryloxy, Cyano, Alkoxy-carbonyl, Alkoxy, Alkyl-
thio oder Trifluormethyl


und

X - für eine Gruppierung -O-, -A-B-oder -B-A-steht,
wobei


A - -O-.



oder



bedeutet und
B - -CH₂-oder



bedeutet wobei R¹ nicht für einen Pyridylrest stehen
darf, wenn X für die Gruppierung -O-steht,
und deren Salze.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 11 3393

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A	US-A-4 563 526 (F.E. DEWHIRST) * ganzes Dokument * ---	1-12	C 07 D 215/26 C 07 D 215/20
A	EP-A-0 114 734 (THE UPJOHN CO.) * ganzes Dokument * ---	1-12	C 07 D 215/22 C 07 D 215/14 C 07 D 213/74
A,P	GB-A-2 181 135 (AMERICAN HOME PRODUCTS CORP.) * ganzes Dokument * ---	1-12	C 07 D 213/38 A 61 K 31/47 A 61 K 31/44
A,P	GB-A-4 661 499 (R.N. YOUNG et al.) * ganzes Dokument * -----	1-12	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			C 07 D 213/00 C 07 D 215/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 27-07-1988	Prüfer LEONARD
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

This Page Blank (uspto)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)